

# BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **A** DER GEMEINDE VISP

Lokal oder Katasternamen	Ennet Brücke - Hell - Im Bergji - Leimgraben - Türlli	
Fläche des Sektors in ha	0.79 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: <b>670</b> m. zu oberst des Sektors: <b>770</b> m. durchschnittliche Höhe des Sektors <b>720</b> m.	
Lage	<b>Nord - Ost</b>	
Hangneigung	Maximale:        % ; Durchschnittliche: <b>30-50</b> % ; Minimale :        % -	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton :        : <b>11</b> % Schluff    : <b>35</b> % Sand:        : <b>54</b> %	Kiesgehalt : <b>X</b>
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : <b>4</b> % Activ :        % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	<b>vorhanden</b> VISP 04	
Geo-Pedologische Beschreibung	<b>vorhanden</b> VISP 04        ex. : (Studie über das Terroire)	
<b>Rebsortenverzeichnis:</b>		
Grand Cru Rebsorte <input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren ( Typizität des Terroirs)	
Angepasste Rebsorte <input type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren	
Erlaubte Rebsorte <input type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.	
Schlecht angepasste Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.	
Verbotene Rebsorte <input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.	
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
<b>WEISSE REBSORTEN</b>		
Chasselas (1) : VV	:	:
Müller Thurgau (f) : VV	:	:
Muscat (1 bis 2) : VV	:	:
Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : V	:	:
	:	:
	:	:
	:	:
	:	:
<b>ROTE REBSORTEN</b>		
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:
Regent (F bis SF) : V	:	:
	:	:
	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas  
 F        : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas  
 1        : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;  
 2        : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas  
 3        : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

**Bemerkungen:**

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt

# BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **B** DER GEMEINDE VISP

Lokal oder Katasternamen	Schlüsselacker - Bergji - Hell	
Fläche des Sektors in ha	6.38 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 670 m. zu oberst des Sektors: 770 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 720 m.	
Lage	Süd Ost (SO)	
Hangneigung	Maximale:     % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale :     % -	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : :       8 % Schluff :    38 % Sand:        54 %	Kiesgehalt : X
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 1 % Activ :        % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	vorhanden    VISP 01	
Geo-Pedologische Beschreibung	vorhanden    VISP 01            ex. : (Studie über das Terroire)	
<b>Rebsortenverzeichnis:</b>		
Grand Cru Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> VV <input checked="" type="checkbox"/> GC	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren ( Typizität des Terroirs)
angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren
Erlaubte Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.
Schlecht angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.
Verbotene Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
<b>WEISSE REBSORTEN</b>		
Chardonnay (1) : V	Pinot blanc (1) : VV	Charmont : V
Chasselas (1) : VV	Savagnin blanc (Heida) (1 bis 2) : VV	:
Gewürztraminer (f) : V	Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : VV	:
Gwäss (2 bis 3) : V	:	:
afnetscha (1) : VV	:	:
er Thurgau (f) : VV	:	:
Muscat (1 bis 2) : VV	:	:
Petite Arvine (3) : V	:	:
<b>ROTE REBSORTEN</b>		
Diolinoir (1 bis 2) : V	Pinot noir (1) : VV	:
Eyholzer Roter (2) : VV	Regent (F bis SF) : V	:
Gallotta (1) : V	:	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Humagne rouge (3) : V	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas  
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas  
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;  
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas  
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

**Bemerkungen:**

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt

# BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS C DER GEMEINDE VISP

Lokal oder Katasternamen	Kropfji - Toppi - Burgerreben - Pfarreireben - Sonnenmatte - Erb - Im Kehr - Hubel	
Fläche des Sektors in ha	4.58 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: 650 m. zu oberst des Sektors: 800 m. durchschnittliche Höhe des Sektors 730 m.	
Lage	Süd-West (SW)	
Hangneigung	Maximale: % ; Durchschnittliche: 30-50 % ; Minimale : % - <b>Terrassen</b>	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton : : 9 % Schluff : 23 % Sand: 68 %	Kiesgehalt : XXX
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : 2.4 % Activ : % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	kein	
Geo-Pedologische Beschreibung	vorhanden VISP 03 ex. : (Studie über das Terroire)	
Grand Cru Rebsorte	<input type="checkbox"/> VV <input type="checkbox"/> GC	<b>Rebsortenverzeichnis:</b> Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren ( Typizität des Terroirs)
Angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> VV	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren
Erlaubte Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> V	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.
Schlecht angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.
Verbotene Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> X	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.
* : Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.		
<b>WEISSE REBSORTEN</b>		
Bianca (1) : V	Savagnin blanc (Heida) (1 bis 2) : VV	:
Charmont (1) : V	Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : VV	:
Chasselas (1) : VV	:	:
Doral (f bis 1) : V	:	:
würztraminer (f) : V	:	:
Müller Thurgau (f) : V	:	:
Muscat (1 bis 2) : V	:	:
Resi (2) : V	:	:
<b>ROTE REBSORTEN</b>		
Diolinoir (1 bis 2) : V	Syrah (2 bis 3) : V	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Garanoir (F) : V	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:
Regent (F bis SF) : V	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas  
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas  
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;  
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas  
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

**Bemerkungen:**

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt

# BESCHREIBUNG DES REBBAUSEKTORS **D** DER GEMEINDE VISP

Lokal oder Katasternamen	Lengacher - Dorf Eyholz	
Fläche des Sektors in ha	2.21 ha	
Höhe (Meter über Meer)	zu unterst des Sektors: <b>650 m.</b> zu oberst des Sektors: <b>700 m.</b> durchschnittliche Höhe des Sektors <b>670 m.</b>	
Lage	<b>Nord-West</b>	
Hangneigung	Maximale:        % ; Durchschnittliche: <b>30-50 %</b> ; Minimale :        % -	
Natur des Bodens (Körnung)	Ton :        : <b>5 %</b> Schluff    : <b>27 %</b> Sand:        : <b>68 %</b>	Kiesgehalt : <b>XXX</b>
Mittlerer Kalkgehalt des Bodens	Total : <b>10.0 %</b> Activ :        % *IVP (Chloroseindex)	
Bodenprofil (e)	<b>kein</b>	
Geo-Pedologische Beschreibung	<b>keine</b> ex. : (Studie über das Terroire)	
<b>Rebsortenverzeichnis:</b>		
Grand Cru Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Besonders gut dem Sektor oder Teilsektor angepasste Rebsorte die es erlaubt einen Wein von grosser Qualität zu produzieren ( Typizität des Terroirs)
Angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte die dafür bürgt einen sehr guten Wein aus diesem Sektor zu produzieren
Erlaubte Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte die es erlaubt einen guten Wein zu gewinnen, eine tiefere Studie ist jedoch angebracht.
Schlecht angepasste Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte bei der die Qualität des Weins mittelmässig ist. Beim nächsten Wiederaufbau ist eine andere Rebsorte anzupflanzen.
Verbotene Rebsorte	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Rebsorte bei der die Qualität des Weines in diesem Sektor ungenügend ist und für die Erzeugung von AOC-Weinen verboten werden kann.
<p><i>*: Gemeinden die bereits über ein Grand-Cru Reglement verfügen oder dies einzuführen möchten, müssen die Rebsorte in den Rebbausektoren klar bezeichnen in denen Grand-Cru Weine produziert werden. Rebsorten (maximal 4) die zukünftig zur Verarbeitung als Grand-Cru Weine bestimmt sind, werden durch die beauftragte Kommission zur „Verfeinerung der Rebbausektoren“ ausgewählt. Die Aufnahme erfolgt anhand eines Reglements, dass durch die Gemeinde oder der beauftragten Kommission gemäss der kantonalen Gesetzgebung und der Kontrollverordnung der Branchenorganisation der Weinwirtschaft erstellt wurde.</i></p>		
<b>WEISSE REBSORTEN</b>		
Chasselas (1) : VV	:	:
Gwäss (2 bis 3) : V	:	:
Lafnetscha (1) : VV	:	:
Müller Thurgau (f) : VV	:	:
Scat (1 bis 2) : V	:	:
esling (2) : V	:	:
Sylvaner Gros Rhin(1 bis 2) : V	:	:
	:	:
<b>ROTE REBSORTEN</b>		
Cornalin du Valais (Landroter)(3) : X	:	:
Eyholzer Roter (2) : VV	:	:
Gamaret (1) : V	:	:
Gamay (1) : VV	:	:
Pinot noir (1) : VV	:	:
Regent (F bis SF) : V	:	:

- F bis SF : - Frühreif bis sehr frühreif : bei der Reife mehr als zehn Tage vor dem Chasselas  
 F : - Frühreif : bei der Reife mehr als fünf Tage vor dem Chasselas  
 1 : - Erste Epoche: bei der Reife fünf Tage vor / nach dem Chasselas;  
 2 : - Zweite Epoche : bei der Reife fünf bis 15 Tage nach dem Chasselas  
 3 : - Dritte Epoche : bei der Reife 15 bis 30 Tage nach dem Chasselas

**Bemerkungen:**

1. Die Qualifizierung einer Rebsorte in eine der 4 vorgenannten Klassen ist nur technischer und qualitativer Natur. Bei einem Wiederaufbau der Parzellen ist es überaus wichtig, mit dem Einkeller Kontakt aufzunehmen.
2. Jede in einem Sektor angepflanzte Rebsorte muss zwingend einer der 4 Klassen zugeteilt werden.
3. Zu Versuchszwecken angepflanzte Rebsorten haben kein Anrecht auf die AOC-Bezeichnung und werden auch nicht in einer der 4 vorgenannten Klassen aufgeführt