

A l'intention des parents  
d'un nouveau-né

**Date** 04.10.2024

### **Concerne : administration du nirsévimab (Beyfortus®) aux nouveau-nés**

Chers parents,

La bronchiolite est une maladie très fréquente chez les enfants de moins de 12 mois en période hivernale. Elle est généralement due au virus respiratoire syncytial (VRS). Le VRS va le plus souvent causer un rhume mais, il peut atteindre le poumon et provoquer une inflammation des petites bronches ou bronchioles (d'où le terme bronchiolite). Un enfant qui a une bronchiolite peut avoir des difficultés à respirer. Les nourrissons de moins de trois mois ont plus de risque de faire des complications et de devoir être hospitalisés.

Pour la première fois cet automne, un traitement très efficace, le **Beyfortus® (nirsévimab)**, permettant de prévenir une infection à VRS, est disponible en Suisse. Ce médicament à base d'anticorps immunise les enfants contre le VRS. Il est administré en une seule dose par injection intramusculaire (comme un vaccin) au cours de la première année de vie.

**Le Beyfortus® est recommandé pour tous les nouveau-nés et nourrissons nés à partir du 1<sup>er</sup> avril 2024.**

- Les enfants nés **entre octobre 2024 et fin mars 2025** doivent idéalement recevoir le traitement durant les premiers jours de vie. Si votre enfant naît durant cette période, le traitement vous sera, en principe, proposé directement à la maternité.
- Pour les enfants nés durant les **premières semaines d'octobre 2024** : pour des raisons d'organisation, il est possible que votre enfant ne puisse bénéficier du traitement durant votre séjour en maternité. Nous vous invitons à prendre, dans ce cas, contact avec son pédiatre pour organiser, dans les plus brefs délais, l'immunisation de votre enfant.
- Les enfants nés **entre avril et septembre 2024**, peuvent recevoir le traitement lors d'une visite chez le pédiatre, idéalement dès le début de l'automne.

Comme tout médicament, Beyfortus® peut entraîner des effets indésirables rares tels que :

- Éruption cutanée ;
- Réaction au site d'injection (rougeur, gonflement et douleur) ;
- Fièvre ;
- Dans de très rares cas, une réaction allergique.

Ces effets indésirables peuvent apparaître jusqu'à quelques jours après l'injection. Ils sont généralement rares, d'intensité légère ou modérée et de courte durée.

Les frais du Beyfortus® sont pris en charge par les caisses maladies à l'exception de la quote-part de 10%.

**Le Médecin cantonal, le groupement des pédiatres valaisans et le groupement des gynécologues-obstétriciens du Valais recommandent vivement ce traitement préventif pour vos enfants.**

Afin d'éviter la contamination par le VRS des nourrissons, des mesures simples de prévention sont également recommandées durant la saison épidémique :

- Avant l'âge de 3 mois, essayer de limiter les visites au cercle des adultes proches et non malades ;
- Se laver les mains à l'eau et au savon (ou utiliser une solution hydro-alcoolique) avant et après la manipulation du bébé ;
- Porter soi-même un masque en cas de rhume, de toux ou de fièvre ;
- Si le reste de la fratrie présente des symptômes d'infection virale, la tenir dans la mesure du possible à l'écart du bébé durant la phase aiguë de l'infection ;
- Eviter si possible les réunions de familles et la fréquentation de lieux publics.

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et restons à disposition pour toute question. Veuillez agréer nos salutations les meilleures.



**Dre Delphine Berthod**  
Médecin cantonal remplaçante  
pour les maladies transmissibles



**Dre Gaud Catho**  
Médecin cantonal remplaçante  
pour les maladies transmissibles

**Copie à**            **Dr Eric Masserey, Médecin cantonal**

**Sources**            **Adapté des documents du canton de Vaud : septembre 2024 – Dr PA Crisinel, Unité d'Infectiologie pédiatrique et Vaccinologie, Service de Pédiatrie, CHUV et Dr S Asner, Membre du comité du Groupement des Pédiatres Vaudois (GPV)**